

**ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE**

Nome do aluno:		<b>SEMANA 29</b> <b>04 À</b> <b>08/10/2021</b>
Professor: CRISTINA	Data: 05/10/2021 TERÇA-FEIRA	Turma: 4 <sup>ª</sup> A
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA / MATEMÁTICA		Entrega: foto via zap

**ATIVIDADE 1 – LÍNGUA PORTUGUESA**

**Leia com atenção, depois responda no seu caderno de classe as questões propostas**

**Texto 1:**

Em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. A metoclopramida não deve ser utilizada nos casos em que a estimulação da motilidade gastrointestinal seja perigosa, como por exemplo na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal. A metoclopramida não deve ser utilizada em pacientes epiléticos.

**Texto 2:**

As mais frequentes são inquietação, sonolência, fadiga, que ocorrem em aproximadamente 10% dos pacientes. Com menor frequência pode ocorrer insônia, cefaléia, tontura, náuseas, erupções cutâneas, incluindo urticária ou distúrbios intestinais.

**Texto 3:**

ADULTOS COMPRIMIDOS: 1 comprimido, 3 vezes ao dia, 10 minutos antes das refeições. INJETÁVEL: 1 ampola cada 8 horas, i.m. ou e.v. SOLUÇÃO ORAL: 2 colheres das de chá (10 ml), 3 vezes ao dia, 10 minutos antes das refeições. CRIANÇAS: A dose não deverá exceder de 0,5 mg/kg/dia e o tratamento deve começar com a dose mais

baixa. 5 a 14 anos: 2,5 - 5 mg, 3 vezes ao dia. 3 a 5 anos: 2 mg, 2 a 3 vezes ao dia. 1 a 3 anos: 1 mg, 2 a 3 vezes ao dia. Abaixo de 1 ano: 1 mg, somente 2 vezes ao dia.

**1. Os três textos acima foram retirados da bula do remédio “Plasil”. Marque a alternativa CERTA em relação a eles:**

- a-) No texto 1 estão as informações sobre a posologia do remédio (como deve ser tomado).
- b) No texto 3 estão as informações sobre as reações adversas que podem ocorrer por quem tomar esse remédio.
- c) No texto 2 estão as informações sobre as indicações desse remédio( para quais tipos de doenças.)
- d) No texto 1 estão as informações sobre as contraindicações do remédio ( quem não pode tomá-lo).

**2 - De acordo com que está escrito no texto 3 da bula, quem deve tomar a MENOR DOSE do remédio Plasil são as crianças:**

- a) ( ) de 5 a 14 anos
- b) ( ) de 3 a 5 anos
- c) ( ) de 1 a 3 anos
- d) ( ) abaixo de 1 ano

## ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

### LIVRO PNLD

#### NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO

- **PÁGINA 153 – divirta-se  
JOGO DO TABULEIRO**



- 
- A) Realizar a leitura dos textos e enunciados das páginas citadas acima.  
B) Responder individualmente às questões.  
C) Enviar foto para correção via WhatsApp.